



Cunigra

nyúltakarmányok



BÁBOLNA
TAKARMÁNY



BÁBOLNA
FEED

Takarmány- kiegészítők

Cunigra

Kistermelői nyúltakarmány-keverék, amely önállóan is alkalmas a táplálóanyag-szükséglet fedezésére, így kisüzemi körülmények között teljes értékű takarmányozást biztosít.

Az alkalmazott takarmány-kiegészítő anyagok (pl. aminosavak, íz- és aromaanyag, természetes alapú hozamfokozó) lehetővé teszik a biztonságos és gazdaságos termelést.

CunigraCoc

A **CUNIGRA** kokcidiosztatikumot tartalmazó változata, mely hatékony segítséget nyújt a bél- és májkokcidiózis megelőzésében. A **CUNIGRA** és a **CUNIGRACOC** azonos összetétele és táplálóanyagtartalma elősegíti, hogy a kisüzemekben szakszerű nyúltakarmányozási technológiát valósítsunk meg. A hizlalás döntő szakaszában a **CUNIGRACOC** etetését javasoljuk, majd a leadás, illetve a levágás előtt 1-2 héttel térjünk rá a **CUNIGRA** etetésére.

Abban az esetben, ha a kokcidiosztatikumot más módon használjuk (pl. ivóvízen keresztül, **COCCIFORT**-kiegészítő stb.), úgy a **CUNIGRA** a hizlalás teljes szakaszában alkalmazható. A többi korcsoport (pl. anyanyulak, baknyulak, tenyész-növendékek) takarmányozásánál – a kokcidiózis kártételének csökkentése érdekében – szintén javasoljuk a két termék meghatározott időszakonként történő szakszerű kombinálását. A kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyszerek alkalmazásakor ügyelni kell a minimális élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására!

Intenzív (nagyüzemi) nyúltakarmányok

CuniStart

Speciális összetételű választási nyúltáp, amelyet elsősorban korai választás alkalmazása esetén javasolunk felhasználni az enteriális eredetű megbetegedések megelőzésére, illetve kártételük csökkentésére. Alacsony energia- és keményítő-, továbbá magas fehérje- (amino-sav-) és vitamintartalma a biztonságos felnevelési eredményeket segíti elő. A termék alapváltozata kokcidiosztatikumot tartalmaz. Alkalmazásánál ügyelni kell az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására.

Garantált beltartalmi érték	Cunigra	CunigraCoc
DE nyúl, MJ/kg	10,55	10,55
Nyersfehérje, %	14,50	14,50
Nyerszsír, %	3,00	3,00
Nyersrost, %	13,50	13,50
Lizin, %	0,60	0,60
Metionin, %	0,24	0,24
Kalcium, %	1,20	1,20
Foszfor, %	0,52	0,52
Nátrium, %	0,21	0,21
A-vitamin, NE/kg	10.000,00	10.000,00
D3-vitamin, NE/kg	1.000,00	1.000,00
E-vitamin, mg/kg	60,00	60,00
Kokcidiosztatikum	–	+++
Élelm. eü. vár. idő	–	+++

Kiszerezés: ömlesztett és 25kg-os zsák

CuniFort

Intenzív hízó- és befejező nyúltáp. A termék gyógyszert, illetve kokcidiosztatikumot nem tartalmaz. Amennyiben a medikációs program folyékony készítményekre épül (ivóvízen keresztüli adagolás), úgy a **CUNIFORT**-ot a hízalás teljes időszakában fel lehet használni.

	CuniStart	CuniFort	CuniLac
	10,80	11,00	11,40
	16,50	16,00	17,50
	2,20	3,20	3,60
	16,50	16,00	14,70
	0,85	0,75	0,92
	0,34	0,33	0,35
	1,22	1,00	1,00
	0,57	0,58	0,58
	0,19	0,20	0,18
	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.000	1.000	1.000
	60,00	60,00	60,00
	+++	-	+++
	+++	-	+++

CuniLac

Speciális anyanyúltáp, amelyet az intenzív körülmények között tartott vemhes és szoptató anyanyulak részére fejlesztettünk ki. Lehetővé teszi a koncentrált takarmányozás megvalósítását, így kompenzálja az anyanyulak testtömegés teljesítménycsökkenését a vemhesség és tejtermelés időszakában. Optimális fehérje-, energia-, vitaminés ásványianyag-tartalma, illetve kiemelkedő aminosavösszetétele biztosítja az anyaállatok életteljesítményének javítását. A termék kokcidiosztatikumot tartalmaz.

Alkalmazásánál ügyelni kell az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására.

A nagyüzemi Cunigra nyúltápok termékjellemzői

- ◆ a közepes- és nagyméretű vállalkozói telepek ideális takarmányai
- ◆ intenzív tartási és takarmányozási körülményekhez igazodó táplálóanyag-ellátás
- ◆ rostfrakciókra történő optimalizálás (emészthetetlen és emészthető rostforrások megfelelő aránya)
- ◆ a különböző korcsoportok igényéhez igazodó energia és keményítőtartalom
- ◆ magas szintű aminosav-kiegészítés (lizin, metionin, treonin)
- ◆ jelentősen megnövelt vitamin- és optimális mértékű mikroelem-kiegészítés (részben szerves kötésben)
- ◆ kiválóan értékesülő, kizárólag növényi eredetű energiakiegészítés
- ◆ természetes alapú hozamfokozók és ízanyagok

Kistermelői nyúltakarmányok

Kistermelői nyúltakarmány-keverékek, amelyek önállóan is alkalmasak a táplálóanyag-szükséglet fedezésére, így kisüzemi körülmények között teljes értékű takarmányozást biztosítanak. Az alkalmazott takarmánykiegészítő-anyagok lehetővé teszik a biztonságos és gazdaságos termelést.

CuniFarmer

Háztáji nyúltakarmány-keverék, mely jól beilleszthető a hagyományos és a kombinált takarmányozási technológiába. Alacsonyabb rosttartalma miatt széna kiegészítés mellett javasoljuk felhasználni.

Cunigra

Kistermelői nyúltakarmány-keverék, amely önállóan is alkalmas a táplálóanyag-szükséglet fedezésére, így kisüzemi körülmények között teljes értékű takarmányozást biztosít. Az alkalmazott takarmánykiegészítő-anyagok (pl. aminosavak, íz- és aromaanyag, természetes alapú hozamfokozó) lehetővé teszik a biztonságos és gazdaságos termelést.

CunigraCoc

A CUNIGRA kokcidiosztatikumot tartalmazó változata, mely hatékony segítséget nyújt a bél- és májkokcidiózis megelőzésében.

Beltartalmi érték	CuniFarmer	Cunigra	CunigraCoc
DE nyúl, MJ/kg	10,50	10,55	10,55
Nyersfehérje, %	13,50	14,50	14,50
Nyerszsír, %	3,00	3,00	3,00
Nyersrost, %	12,00	13,50	13,50
Lizin, %	0,50	0,60	0,60
Metionin, %	0,18	0,24	0,24
Kalcium, %	1,00	1,20	1,20
Foszfor, %	0,50	0,52	0,52
Nátrium, %	0,18	0,21	0,21
A-vitamin, NE/kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D3-vitamin, NE/kg	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E-vitamin, mg/kg	60,00	60,00	60,00
Kokcidiosztatikum	-	-	+++
Élelm. eü. vár. idő, nap	-	-	+++

Takarmány- kiegészítők

CocciFort

Mikroelemeket tartalmazó takarmánykiegészítő, amely kokcidiosztatikum-tartalmánál fogva segít megelőzni a nyulak bél- és májkokcidiózisát.

Garantált beltartalmi érték	CocciFort
Nyersfehérje, %	17,20
Kalcium, %	1,20
Foszfor, %	0,25
Nátrium, %	0,15
Cink, mg/kg	400,00
Szelén, mg/kg	1,50
Jód, mg/kg	3,60
Mangán, mg/kg	500,00
Vas, mg/kg	380,00
Kokcidiosztatikum	+++
Élelm. eü. vár. idő	+++

Kiszereles: 1 kg-os dobozokban (4 mm átmérőjű granulált forma)

Felhasználási javaslat

A betegség megelőzésére, akár pellet, akár daraszerű nyúl takarmánykeverékkel 1:9 arányban kell elkeverni. Nyulaknak választási korban (4-5 hetes) min. 7 napig vagy 8-10 hetes korukig etetni.

Idősebb állományok esetén havonta egyszer 7 napon keresztül etessük.

Kapcsolat

A bábolnai takarmányokkal kiváló termelési eredményeket érhet el, mert

- ◆ több évtizedes takarmánygyártási múltunk
- ◆ korszerű, tudományos háttérünk és
- ◆ az állattenyésztés minden oldalára kiterjedő szakmai tapasztalatunk

biztosítja termékeink magas minőségét és a fejlődéssel való lépéstartást.

A termékspecifikáción feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, a folyamatos termékfejlesztések miatt változhatnak. A garantált beltartalmi értékeket a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

2942 Nagyigmánd,

Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

telefon: +36 34 557-050, fax: +36 34 557-060

info@babolnatakarmany.hu

www.babolnatakarmany.hu

vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu